

Unità operativa U0936

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
45.00	RCV3	ROCCAVERANO franco-grossolana, fase scheletrica a pietre verdi	Typic Haplustept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
15.00	VFN1	VILLA FONTANA franco- grossolana, fase tipica	Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	CDC1	COSTA DI CROVERA franco-grossolana, fase tipica	Lithic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
20.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Delineazioni comprese tra il Bormida di Spigno e l'Erro, a ovest di Pareto (AL) e a sud di Malvicino (AL).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti collinari che presentano pendenze elevate e dislivelli notevoli con crinali angolosi ed aspetto quasi montano. Il substrato è costituito da arenarie grossolane in bancate associate a conglomerati poligenici con inclusioni di pietre verdi. L'uso del suolo è esclusivo a bosco; solo qualche residua porzione coltivata in prossimità dei crinali.

Caratteri differenziali dei suoli

in questa unità prevalgono gli Inceptisuoli della serie ROCCAVERANO in fase scheletrica e i VILLAFONATANA tipica. Si tratta di suoli impostati su litologie subaffioranti marnoso-arenacee alternate a substrati a pietre verdi, per cui la reazione del suolo è generalmente neutra o subacida, solo a tratti può essere calcarea. Le tessiture sono franco-sabbiose alternate a franche nelle zone più ricche di pietre verdi. In subordine agli Inceptisuoli, nelle zone più erose e pendenti, si trova la fase tipica COSTA DI CROVERA tipica, caratterizzata da tessiture franco-sabbiose, poco profonda e calcarea.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Assenza di orizzonte di alterazione: COSTA DI CROVERA tipica 1. presenza di orizzonte cambico Bw: vai a 2 2. assenza di scheletro lungo il profilo: ROCCAVERANO scheletrica 2. assenza di scheletro lungo il profilo: VILLAFONTANA tipica.

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente, solo del tutto sporadicamente sotto copertura boscata sono stati osservati suoli evoluti ascrivibili agli alfisuoli, sempre non calcarei.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026