

Unità operativa U0955

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	VFN1	VILLA FONTANA franco- grossolana, fase tipica	Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	RCV1	ROCCAVERANO franco-grossolana, fase tipica	Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
15.00	CDC1	COSTA DI CROVERA franco-grossolana, fase tipica	Lithic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
15.00	CSB1	CASTEL BOGLIONE franco-grossolana, fase tipica	Typic Ustorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

In destra Bormida tra Monesiglio (CN) e Torre Bormida (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti collinari a pendenza molto elevata formati per erosione al piede operata dal corso d'acqua principale. Il substrato è sostituito da arenarie che si alternano a banchi nettamente meno potenti di marne argillose (Formazione di Cassinasco). Esclusivamente a bosco con presenza del Castagno, che si ritrova in corrispondenza dei suoli decarbonatati.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli VILLAFONTANA e ROCCAVERANO, entrambi con un orizzonte cambico e tessiture franco-grossolane, si differenziano per la presenza di calcare: i primi sono decarbonatati, i secondi sono calcarei. Gli altri suoli presenti sono calcarei e non hanno orizzonti di alterazione: si differenziano per tessitura e contenuto in scheletro: i suoli CASTEL BOGLIONE sono franco-grossolani e i COSTA DI CRAVERA sono franco-grossolani con profondità utile non superiore a 30 cm.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Assenza di orizzonti pedogenetici: vai a 2 1. presenza di orizzonti pedogenetici: vai a 3 2. tessitura franco-grossolana: CASTEL BOGLIONE franco-grossolana 2. tessitura limoso-grossolana: COSTA DI CRAVERA franco-grossolana 3. presenza di carbonati: ROCCAVERANO franco-grossolana 3. assenza di carbonati: VILLA FONTANA franco-grossolana

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente ma si è osservata una precisa corrispondenza tra copertura a bosco di castagno e la presenza dei Dystric Haplustept.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026