

Unità operativa U1019

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
70.00	PET1	PETIVA scheletrico-franca, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	PRR1	PRIARO scheletrico-franca, fase tipica	Typic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Una sola delineazione di forma stretta ed allungata in direzione ovest-est costituisce questa Unità cartografica che si posiziona nella pianura vercellese da Santhià verso Vercelli.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Paesaggio tipicamente risicolo caratterizzato da superfici pianeggianti che, prima degli spianamenti messi in atto per la coltura del riso, mostrava come questa Unità cartografica rappresenti un leggero avvallamento rispetto alla pianura principale. Quesato è il segno di un antico passaggio della Dora Baltea che prima di rompere la morena all'altezza di Mazzè (TO) usciva ad est del lago di Viverone.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli PRIARO non sono coltivati a riso e quindi non mostrano il topsoil grigio (ferro ridotto) tipico delle condizioni antraquiche dei suoli PETIVA.

Chiave di riconoscimento dei suoli

Presenza di condizioni antraquiche indotte dalla risicoltura: PETIVA tipica
Assenza di condizioni antraquiche indotte dalla risicoltura: PRIARO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

I suoli PRIARO si posizionano negli appezzamenti non coltivati a riso, soprattutto presenti nella porzione occidentale dell'Unità cartografica.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026