

Unità operativa U1023

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
45.00	SLS1	SALASCO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
35.00	SNG1	SANGUINOLOTO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	SPM1	SAN PIETRO MOSEZZO limoso-grossolana, fase tipica	Anthraquic Hapludalf, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica formata da 4 delineazioni di estensione relativamente ridotta poste nei pressi di Olcenengo (VC) e, più a sud, ad ovest di Vercelli e da Sali Vercellese (VC) verso Larizzate (VC).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

L'Unità rappresenta aree di forma allungata, leggermente depressa rispetto al livello della pianura principale almeno in origine. Attualmente questo minimo dislivello è stato completamente occultato dagli spianamenti effettuati in conseguenza della risicoltura estensiva presente. Si tratta probabilmente di un antichi passaggi fluviali probabilmente da attribuire alla Dora Baltea. I depositi di partenza sono sabbioso fini.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli SALASCO sono caratterizzati da una netta prevalenza dell'ossidazione negli orizzonti posti sotto la soletta di lavorazione mentre i suoli SANGUINOLOTO mostrano caratteri di idromorfia (evidente riduzione del ferro) a partire da circa 50-60 cm di profondità. I suoli SAN PIETRO MOSEZZO si differenziano dai precedenti perchè hanno un grado evolutivo maggiore, caratterizzato dalla presenza di un orizzonte argillico (pellicole di argilla sugli aggregati di suolo).

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. presenza di un orizzonte argillico evidente (pellicole di argilla sugli aggregati): SAN PIETRO MOSEZZO tipica 1.
 assenza di un orizzonte argillico evidente (pellicole di argilla sugli aggregati): vai a 2
 2. presenza di caratteri di idromorfia evidenti entro i 65 cm di profondità (escludendo l'orizzonte lavorato): SANGUINOLOTO tipica 2
 assenza di caratteri di idromorfia evidenti oltre i 65 cm di profondità (escludendo l'orizzonte lavorato): SALASCO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Da approfondire la distribuzione dei suoli all'interno dell'Unità.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026