

Unità operativa U1058

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	CMP1	CAMPOMAGNO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	BIA1	BIANDRATE franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Hapludalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
20.00	PRZ1	PARAZZOLINO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Delineazioni poste nella zona nordest del comune di Novara, lungo il Terdoppio

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Terrazzi del Terdoppio coltivati in gran parte a riso, ma con uso agrario ridotto da una imponente espansione urbana, che sta trasformando rapidamente il territorio inglobando i campi in una fitta rete viaria ed edilizia.

Caratteri differenziali dei suoli

In questa unità prevale la fase CAMPOMAGNO franco-grossolana, Inceptisuolo caratterizzato da un grado di pedogenesi vicino all'Alfisuolo. La tessitura è franco-sabbiosa, il drenaggio buono, le ghiaie sono scarsamente presenti entro il primo metro, la reazione è subacida, la velocità d'infiltrazione è moderatamente elevata. Sono presenti poi gli Alfisuoli della fase BIANDRATE franco-grossolana, che hanno un drenaggio mediocre, in parte per la presenza di una maggior quantità di terra fine e in particolare di sabbie molto fini e limi, in parte per locali condizioni di prima falda più superficiale. Infine sono stati descritti anche i suoli PARAZZOLINO franco-grossolani, presenti nell'unità, con evidenze di idromorfia lungo tutto il profilo, pur denotando tessiture più sabbiose e ghiaie entro il metro, a circa 70-80 cm, ma confermando drenaggio mediocre e moderata disponibilità di ossigeno.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di pellicole di argilla: BIANDRATE franco-grossolana 1. Assenza di pellicole di argilla: vai a 2 2. Presenza di caratteri di idromorfia lungo tutto il profilo: PARAZZOLINO franco-grossolana 2. Assenza di caratteri di idromorfia lungo tutto il profilo: CAMPOMAGNO franco-grossolana

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026