

Unità operativa U1060

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	SPM1	SAN PIETRO MOSEZZO limoso-grossolana, fase tipica	Anthraquic Hapludalf, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
25.00	PRZ1	PARAZZOLINO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	FIS1	FISNENGO franco-grossolana, fase tipica	Typic Endoaquept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
15.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da una sola delineaione di forma stretta e allungata che si posiziona ad ovest del terrazzo antico di Bellinzago Novarese, da Badia di Dulzago a C.na dell'Argine(No).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Terrazzo alluvionale relativamente antico, che è intermedio tra la pianura principale (a cui è collegato con un raccordo lieve che non mette in evidenza una scarpata propriamente detta) e il terrazzo antico di Bellinzago da cui è separato da evidente scarpata. Interessante osservare l'evidente salto di terrazzo che esiste tra questa superficie (di pertinenza del Terdoppio) e le superfici di pertinenza del Ticino più ad est. L'uso del suolo è sostanzialmente adibito per la totalità alla coltivazione del riso in sommersione.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli SAN PIETRO MOSEZZO tipica sono Alfisuoli con un orizzonte di accumulo d'argilla che mostrano segni di idromorfia naturale nella seconda parte del profilo. PARAZZOLINO tipica è altrettanto idromorfa ma non ha un orizzonte di accumulo di argilla, così come FISNENGO tipica che è inoltre caratterizzata da evidenti segni di idromorfia a partire dal subsoil (essendo già il topsoil influenzato dalle condizioni anthraquiche).

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. presenza di un orizzonte di accumulo d'argilla: SAN PIETRO MOSEZZO tipica 1. assenza di un orizzonte di accumulo di argilla: vai a 2 2. idromorfia evidente in tutto il profilo: FISNENGO tipica 2. idromorfia naturale evidente oltre i 60 cm di profondità: PARAZZOLINO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Da approfondire.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026