

Unità operativa U1116

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
70.00	MAD2	MADDALENA franco-fine, fase umida	Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
30.00	CRV3	CERVERE franco-grossolana su scheletrico-sabbiosa, fase umida	Typic Haplustalf, coarse-loamy over sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità costituita da 5 delineazioni che si trovano nei pressi del Torrente Corsaglia nel comune di Niella Tanaro (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Terrazzo ondulato che costituisce il livello più basso dei terrazzi alluvionali antichi. Esso si trova sopra la profonda incisione operata dall'azione erosiva del Torrente Corsaglia. Il substrato è costituito da depositi alluvionali antichi che hanno un livello di ghiaie e ciottoli a circa un metro di profondità forse per l'antica influenza del torrente Corsaglia prima che quest'ultimo approfondisse il suo corso. I suoli sono evoluti e profondi. L'uso del suolo è prevalentemente occupato da coltivi.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli MADDALENA umida presentano tessiture piuttosto fini con percentuali di argilla superiori al 18% mentre i suoli CERVERE ghiaiosa hanno tessiture più grossolane e scheletro abbondante a partire da circa 60-80 cm di profondità.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di abbondante scheletro a partire dalla profondità di 60-80 cm: CERVERE ghiaiosa 1. assenza di abbondante scheletro a partire dalla profondità di 60-80 cm: MADDALENA umida.

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello di distribuzione ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026