

Unità operativa U1129

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	CDZ1	CADUZZO franco- grossolana, fase tipica	Lithic Udorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
30.00	SLE1	SALE franco-grossolana, fase tipica	Typic Udorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
20.00	CUN1	CUNIBERTI franco-grossolana, fase tipica.	Typic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Tra il corso del Tanaro e quello del Corsaglia e il fiume Ellero, da Mombasiglio (CN) fino a Vasco (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti a reggipoggio a pendenza da acclive a fortemente acclive che si elevano in crinali affilati. Il substrato è costituito da intercalazioni arenaceo-marnose. L'uso del suolo è caratterizzato da bosco per le elevate pendenze e qualche coltivo che, nonostante le pendenze, si avvantaggia delle esposizioni favorevoli (ovest).

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli CUNIBERTI sono suoli debolmente evoluti e calcarei che mostrano un orizzonte con alterazione di colore e formazione di struttura (Bw). I suoli SALE e CADUZZO sono suoli non evoluti e calcarei: i CADUZZO si distinguono dai SALE per la profondità ridotta dovuta all'affiorare, entro i primi 50 cm, del substrato sottostante. Tutti questi suoli hanno tessiture con argilla inferiore al 18%.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di un orizzonte con sviluppo di colore e/o struttura: CUNIBERTI tipica 1. assenza di un orizzonte con sviluppo di colore e/o struttura: vai a 2 2. profondità del suolo inferiore ai 50 cm: CADUZZO tipica 2. profondità del suolo superiore ai 50 cm: SALE tipica.

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026