

Unità operativa U1135

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	PRZ1	PARAZZOLINO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
40.00	CMP1	CAMPOMAGNO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da due delinearzioni situate tra Granozzo (No), Cameriano (No) e Casalino (No) fino al confine piemontese - lombardo.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura principale lievemente ondulata e incisa da antichi passaggi fluviali non più attivi attualmente. Le evidenti ondulazioni osservabili fino ad alcune decine di anni fa sono oggi poco riconoscibili in conseguenza delle importanti lavorazioni agrarie finalizzate alla messa in livello delle camere di risaia. L'uso del suolo è per la quasi totalità dedicato alla risicoltura in sommersione.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli PARAZZOLINO sono leggermente meno evoluti e, soprattutto, mostrano evidenza di condizioni naturali di idromorfia a partire da 50-60 cm di profondità. I suoli CAMPOMAGNO, mediamente più evoluti (a tratti paiono transizioni agli Alfisuoli) non sono naturalmente idromorfi o, se lo sono, solo a profondità superiori a 80 cm - 1 m.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1 evidenze di idromorfia naturale entro i 60-70 cm: PARAZZOLINO tipica 1 evidenze di idromorfia naturale oltre i 60-70 cm: CAMPOMAGNO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Da approfondire. Ad oggi non è stato individuato un modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026