

Unità operativa U1175

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
35.00	RIV1	RIVODORA franco-fine, fase tipica	Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	SNN1	SINNO franca-fine, fase tipica	Typic Haplustalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
5.00	XXX0	Altri suoli		
30.00	VFN1	VILLA FONTANA franco-grossolana, fase tipica	Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

In destra Bormida all'altezza di Castino (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versante collinare uniforme impostato su strati a franapoggio, con pendenza moderata e prevalentemente esposto a ovest/nord-ovest. Il substrato è costituito da depositi pliocenici marnosi a tessiture ricche di limi ed argille. L'uso del suolo è caratterizzato da coltivi con cerealicoltura non irrigua praticoltura e, secondariamente, da vigneti.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli RIVODORA sono debolmente evoluti con la presenza di un orizzonte di alterazione di colore (Bw). I suoli SINNO franco-fini sono caratterizzati dalla presenza di argilla illuviale. Entrambi questi suoli sono non calcarei, per effetto dei processi di decarbonatazione, e hanno tessiture fini con argilla > 18%.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di orizzonte argillico Bt: SINNO tipica 1. assenza di orizzonte argillico: vai a 2 2. Presenza di tessitura franco-grossolana: VILLA FONTANA tipica 2. Presenza di tessitura franco-fine: RIVODORA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026