

Unità operativa U1186

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	PML1	PEMOL limoso-fine, fase tipica	Calcic Haplustept, fine-silty, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
25.00	LZZ1	LOAZZOLO limoso-fine, fase tipica	Typic Ustorthent, fine-silty, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
25.00	BLA1	BLANGERA franco-fine, fase tipica	Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

In sinistra idrografica del fiume Tanaro da Guarene (CN) a Magliano Alfieri (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti collinari a pendenza moderatamente elevata. Il substrato è costituito da intercalazioni arenaceo-marnose. L'uso del suolo è esclusivamente agricolo con coltura e qualche vigneto.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli BLANGERA sono suoli calcarei debolmente evoluti che presentano un orizzonte di alterazione di colore (Bw); da questi si differenziano, pur avendo lo stesso grado evolutivo, i suoli PEMOL che presentano un orizzonte con accumulo di concrezioni di carbonato di calcio a circa 80-100 cm di profondità. I suoli LOAZZOLO non mostrano alcuno sviluppo di processi pedogenetici, hanno colore del tutto simile a quello del substrato originario e sono calcarei. Tutti questi suoli hanno tessiture con elevato contenuto di argilla (>18%).

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di un orizzonte di alterazione (Bw): vai a 2
1. assenza di un orizzonte di alterazione (Bw): LOAZZOLO tipica
2. assenza di un orizzonte di accumulo di carbonato di calcio: BLANGERA tipica
2. presenza di un orizzonte di accumulo di carbonato di calcio: PEMOL tipica.

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026