

Unità operativa U1187

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
45.00	TRV2	TRIVERSA franco-grossolana, fase carbonatica	Fluventic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	LZZ1	LOAZZOLO limoso-fine, fase tipica	Typic Ustorthent, fine-silty, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
10.00	BRS1	BRASATO franco-grossolana, fase tipica	Typic Haplustept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	BLA1	BLANGERA franco-fine, fase tipica	Typic Haplustept, fine-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
15.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

In sinistra idrografica del fiume Tanaro, tra Guarene (CN) e Govone (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Fondivalle di raccordo tra i rilievi collinari e la pianura del Tanaro. Il substrato è costituito da colluvium di marne. L'uso del suolo è caratterizzato da cerealicoltura dominante, con praticoltura e qualche pioppeto.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli BLANGERA e BRASATO sono suoli profondi, calcarei, che mostrano la formazione di orizzonti consviluppo di colore e/o struttura. Si distinguono per le tessiture più fini nella BLANGERA (argilla >18%). Nei suoli TRIVERSA i depositi derivano da apporti alluvio-colluviali, e mostrano una decrescita irregolare del contenuto in carbonio organico lungo il profilo mentre negli altri Inceptisuoli (BRASATO e BLANGERA) i depositi sono direttamente quelli collinari con un progressivo decremento del contenuto di carbonio organico a partire dalla superficie. Infine i LOAZZOLO sono privi di evoluzione con il topsoil che risulta del tutto simile al subsoil ed al substrato. Tutti questi suoli sono calcarei, tutti a tessiture fini, tranne i suoli BRASATO che sono franco-grossolani.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di un orizzonte di alterazione (Bw): vai a 2 1. assenza di un orizzonte di alterazione (Bw): LOAZZOLO tipica
2. presenza di una decrescita irregolare del contenuto in carbonio organico lungo il profilo: TRIVERSA carbonatica 2. assenza di una decrescita irregolare del contenuto in carbonio organico lungo il profilo: vai a 3 3. quantità di argilla >18%: BLANGERA tipica 3. quantità di argilla <18%: BRASATO tipica.

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026