

Unità operativa U1202

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
20.00	CUN1	CUNIBERTI franco-grossolana, fase tipica.	Typic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
50.00	SLE1	SALE franco-grossolana, fase tipica	Typic Udorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
20.00	CDZ1	CADUZZO franco- grossolana, fase tipica	Lithic Udorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

A nord di Mombasiglio (CN).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti collinari da debolmente a moderatamente acclivi. Simile alla U1201 ma con profili più uniformi le cui forme sono state meno profondamente alterate dai processi erosivi. Il substrato è costituito da marne (Marne di Paroldo). L'uso del suolo è caratterizzato da coltivi con mais, grano, orzo, praticoltura e seminativi in rotazione.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli CUNIBERTI sono suoli debolmente evoluti e calcarei che mostrano un orizzonte con alterazione di colore e formazione di struttura (Bw). I suoli SALE e CADUZZO sono suoli non evoluti e calcarei: i CADUZZO si distinguono dai SALE per la profondità ridotta dovuta all'affiorare, entro i primi 50 cm, del substrato sottostante. Tutti questi suoli hanno tessiture con argilla inferiore al 18%.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di un orizzonte con sviluppo di colore e/o struttura: CUNIBERTI tipica 1. assenza di un orizzonte con sviluppo di colore e/o struttura: vai a 2 2. profondità del suolo inferiore ai 50 cm: CADUZZO tipica 2. profondità del suolo superiore ai 50 cm: SALE tipica.

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026