

Unità operativa U1204

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
45.00	CUN1	CUNIBERTI franco-grossolana, fase tipica.	Typic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	INCEPTISUOLI
35.00	CDZ1	CADUZZO franco- grossolana, fase tipica	Lithic Udorthent, coarse-loamy, mixed, calcareous, mesic	ENTISUOLI
20.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Tra Mondovì e San Michele Mondovì (CN), in destra ed in sinistra idrografica del torrente Corsaglia.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Rilievo collinare a tratti solcato da profonde incisioni costituito da una successione di versanti a franapoggio e a reggipoggio con prevalenza dei primi. I crinali, contrariamente ai rilievi circostanti, hanno direttrice principale est-ovest. Il substrato è costituito da marne con intercalazioni arenacee. L'uso del suolo è costituito da coltivi con cerealicoltura e prati sulle porzioni a franapoggio, mentre prevale il bosco sulle porzioni più pendenti con giacitura e reggipoggio.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli CUNIBERTI sono suoli debolmente evoluti e calcarei che mostrano un orizzonte con alterazione di colore e formazione di struttura (Bw). I suoli CADUZZO sono suoli non evoluti e calcarei e hanno profondità ridotta dovuta all'affiorare, entro i primi 50 cm, del substrato sottostante. Tutti questi suoli hanno tessiture con argilla inferiore al 18%.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di un orizzonte con sviluppo di colore e/o struttura: CUNIBERTI tipica 1. assenza di un orizzonte con sviluppo di colore e/o struttura: CADUZZO tipica.

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026