

Unità operativa U1223

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	VLZ1	VALZO franco-fine, fase tipica	Anthraquic Hapludalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
30.00	VLZ2	VALZO franco-fine, fase ghiaiosa	Anthraquic Hapludalf, fine-loamy, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
20.00	MGN4	MAGNONEVOLO limoso-fine, fase anthraquico grossolana	Oxyaquic Glossudalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

1 unica delineazione sul margine del terrazzo di Formigliana (VC) in destra Cervo

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Bordo settentrionale del terrazzo che viene eroso regressivamente da affluenti del Cervo e dal Cervo stesso. Queste superfici, poste ad un livello nettamente più basso rispetto alla piana superiore, non offrono all'agricoltura le stesse risposte produttive, ma la risicoltura ha comunque voluto estendersi fino ad utilizzarne gran parte.

Caratteri differenziali dei suoli

Alfisuoli più o meno erosi, con substrato affiorante talora entro il metro; nelle zone meno erose sono riconoscibili i suoli originari della piana nella loro fase grossolana.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Argilla >30%: MAGNONEVOLO antraquica grossolana 1. Argilla <30%: vai a 2 2. Ghiaie entro il metro: VALZO ghiaiosa 2. Ghiaie oltre il metro: VALZO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026