

Unità operativa U1225

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione
Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00	BNO1	BENONE sabbiosa, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, sandy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	BNO2	BENONE sabbiosa, fase poco profonda	Anthraquic Eutrudept, sandy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	ELV1	ELVO scheletrico-franca, fase tipica	Typic Udifluent, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

3 delineazioni lungo il Cervo e suoi affluenti di sinistra a Buronzo (VC) e 2 a Formigliana (VC) sempre lungo lo stesso fiume.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Fascia intermedia di suoli a pedogenesi debole e costituiti da depositi alluvionali a matrice sabbiosa, fra l'alveo straordinario e il livello di pianura più antico, compreso fra Buronzo, Balocco e Villarboit, dominio incontrastato della risicoltura.

Caratteri differenziali dei suoli

Nelle zone più vicine al fiume prevalgono i suoli più ricchi di scheletro e con pedogenesi pressochè nulla (ELVO franco-scheletrica tipica), mentre nelle fasce distali si alterna la BENONE sabbiosa tipica con la sua fase poco profonda, entrambe debolmente pedogenizzate.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Nessuna evidenza di pedogenesi : ELVO tipica 1. Qualche debole segno di alterazione: vai a 2 2. Ghiaie abbondanti da 60 cm: BENONE poco profonda 2. Ghiaie scarse fino a 100 cm: BENONE tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026