

Unità operativa U1231

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Consociazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	BNO1	BENONE sabbiosa, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, sandy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
15.00	XXX0	Altri suoli		
25.00	BNO2	BENONE sabbiosa, fase poco profonda	Anthraquic Eutrudept, sandy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	CMP1	CAMPOMAGNO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Un'unica delimitazione costituisce questa Unità cartografica. E' situata nel Vercellese, tra i corsi dei torrenti Elvo e Cervo prima della loro confluenza.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura uniforme costituita da depositi alluvionali grossolani, in parte provenienti dalle alluvioni del Cervo ed in parte influenzati dalle deposizioni dell'Elvo. L'uso del suolo è totalmente adibito alla risicoltura in sommersione.

Caratteri differenziali dei suoli

Sono presenti tipologie di suolo poco pedogenizzate, sabbiose o sabbioso-ghiaiose, originate da apporti alluvionali recenti di Cervo ed Elvo (fasi BENONE tipica e poco profonda), accanto a suoli più evoluti erosi (CAMPOMAGNO tipica), superstiti di antiche superfici ormai cancellate dai fiumi e dall'uomo, ma riconoscibili per deboli tracce di illuviazione di argilla. In genere le permeabilità sono elevate, le tessiture sciolte e la reazione subacida.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Chiare evidenze di orizzonti di alterazione e tessiture franco-sabbiose: CAMPOMAGNO tipica 1. Deboli segni di pedogenesi e tessiture sabbiose: vai a 2 2. Ghiaie superficiali: BENONE poco profonda 2. Ghiaie oltre 80 cm: BENONE tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026