

Unità operativa U1264

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00	RSP1	RASPAGNA, franco grossolana, fase tipica	Dystric Fluventic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
20.00	TCN1	TICINO scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Typic Udifluent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI
20.00	TCN2	TICINO sabbioso-scheletrica, fase di alveo	Typic Udifluent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

In destra idrografica del fiume Ticino, all'altezza di Marano Ticino (NO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Terrazzo alluvionale del Ticino debolmente ondulato, elevato di qualche metro rispetto alle superfici ancora interessate dalle esondazioni ordinarie e straordinarie del fiume. E' simile all'unità che la delimita a nord e a sud (U1272) ma è leggermente sopraelevata rispetto a questa. L'uso del suolo è quasi esclusivamente occupato dalla praticoplutra e solo sporadicamente dalla cerealicoltura. Alcune porzioni boscate identificano passate diversioni fluviali che hanno lasciato deposizioni ricche di sabbie e ghiaie.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli TICINO non mostrano alcuno sviluppo di pedogenesi, mentre i suoli RASPAGNA evidenziano la formazione di un orizzonte cambico all'interno del profilo.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di un orizzonte con sviluppo di struttura e colore (formazione di un orizzonte Bw) : RASPAGNA tipica 1. assenza di un orizzonte con sviluppo di struttura e colore (formazione di un orizzonte Bw): vai a 2 2. tessitura prevalentemente franco-sabbiosa nel topsoil: TICINO tipica 2. tessitura prevalentemente sabbioso-franca nel topsoil: TICINO di alveo.

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

○

Data di aggiornamento

04.03.2026