

# Unità operativa U1278

## Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

| Percentuale | Fase | Nome                                    | Classificazione                                       | Ordine       |
|-------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 60.00       | BOG1 | BOGOGNO, franco grossolana, fase tipica | Humic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic | INCEPTISUOLI |
| 30.00       | OLG1 | OLEGGIO, limoso-grossolana, fase tipica | Typic Hapludalf, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic  | ALFISUOLI    |
| 10.00       | XXX0 | Altri suoli                             |                                                       |              |

## Localizzazione geografica dell'Unità

A sud di Veruno (NO).

## Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Livelli di terrazzo di origine alluvionale e/o fluvioglaciale che identificano superfici debolmente concave determinate dal passaggio di corsi d'acqua secondari. Queste superfici sono poste al livello della pianura principale e testimoniano di passaggi fluviali moderatamente recenti che hanno determinato rilevanti processi erosivi delle superfici più antiche con l'apporto di materiali limosi e sabbiosi non calcarei. Questi depositi hanno subito nel tempo un grado di sviluppo pedogenetico da debole a moderato e presentano, nel primo caso, uno sviluppo di colore e struttura nel subsoil e, nel secondo caso, l'eluviazione di argilla dagli orizzonti più superficiali e l'illuviazione della stessa negli orizzonti più profondi con la formazione di un orizzonte Bt. Talora in profondità sono presenti ciottoli e ghiaia che limitano la profondità utile e testimoniano gli antichi alluvionamenti e i ricoprimenti dei conoidi di scaricatori fluvioglaciali da cui si è originata quest'area. L'uso del suolo è costituito da predominanza delle colture cerealicole con larga prevalenza di mais, coltivato in asciutta, e secondariamente da praticoltura.

## Caratteri differenziali dei suoli

I suoli BOGOGNO presentano una debole evoluzione pedogenetica che si manifesta con uno sviluppo di colore e struttura nel subsoil mentre i suoli OLEGGIO sono più evoluti e presentano per questo nel subsoil un orizzonte con illuviazione di argilla di colore rossastro.

## Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di un orizzonte con evidenza di illuviazione di argilla di colore rossastro (hue 7.5 YR o più rosso): OLEGGIO tipica 1. assenza di un orizzonte con evidenza di illuviazione di argilla di colore rossastro (hue 7.5 YR o più rosso): BOGOGNO tipica.

## Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello di distribuzione ricorrente.

## Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

## Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

## Data di aggiornamento

04.03.2026