

Unità operativa U1308

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	SRP1	STROPPIANA franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
25.00	SNG1	SANGUINOLENTO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
15.00	SLS1	SALASCO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	CLT1	CLOTILDE franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Hapludalf, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Una delineaione che copre un'ampia superficie costituisce questa Unità cartografica posizionata nella pianura vercellese a nord di Desana e Asigliano Vercellese e a nord-ovest di Pezzana.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Superficie principale della pianura, relativamente uniforme, sulla quale un intervento antropico importante ha sostanzialmente eliminato le lievi ondulazioni naturali. La superficie interessata, posta in sinistra idrografica rispetto al rio Borla, è costituita da depositi sabbioso fini e limosi. Tutta questa parte di pianura vercellese è stata probabilmente originata da antichissimi passaggi della Dora Baltea.

Caratteri differenziali dei suoli

CLOTILDE è un suolo evoluto (Alfisuolo) caratterizzato dalla presenza di un orizzonte argillico. Gli altri suoli sono ascrivibili all'ordine degli Inceptisuoli e si differenziano per i seguenti caratteri: SANGUINOLENTO è un suolo relativamente giovane e caratterizzato da idromorfia naturale visibile entro i 60-70 cm di profondità. STROPPIANA, pur frequentemente segnato da idromorfia, si differenzia dal precedente per un maggiore grado evolutivo ma soprattutto per colori che tendono più al giallastro o al bruno giallastro rispetto alla dominanza dei colori bruni del suolo SANGUINOLENTO. SALASCO è un suolo classificato tra gli Inceptisuoli ma evidentemente di transizione agli Alfisuoli, come evidenziato dalla presenza di qualche pellicola d'argilla e dallo sviluppo di ossidi di ferro.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di un evidente orizzonte argillico (pellicole d'argilla sugli aggregati): SAN PIETRO MOSEZZO tipica 1. Assenza di un evidente orizzonte argillico (pellicole d'argilla sugli aggregati): vai a 2 2. Assenza di condizioni di idromorfia naturale entro 60-70 cm: SALASCO tipica 2. Presenza di condizioni di idromorfia naturale entro 60-70 cm: vai a 3 3. colori dominanti bruni: SANGUINOLENTO tipica 3. Colori dominanti sul giallastro o bruno giallastro: STROPPIANA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato individuato un modello ricorrente nella distribuzione dei suoli.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026