

Unità operativa U1312

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	SNG1	SANGUINOLENTO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
15.00	SPM1	SAN PIETRO MOSEZZO limoso-grossolana, fase tipica	Anthraquic Hapludalf, coarse-silty, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
20.00	TRC1	TRECATE franco-grossolana su franco-scheletrica, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
15.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Questa unità si trova nella pianura vercellese e si estende con una sola delimitazione nel territorio dei comuni di Ronsecco (VC) e Desana (VC), fino all'abitato di Costanzana (VC).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura uniforme solo a tratti debolmente ondulata caratterizzata da sedimenti costituiti da sabbie e ghiaie derivanti da deposizioni operate da un corso d'acqua, ora non più identificabile, che ha scaricato materiali più grossolani su questa porzione di pianura, distinguendola dalle superfici adiacenti. Le ondulazioni osservabili fino ad alcune decine di anni fa, sono oggi poco riconoscibili in conseguenza delle importanti lavorazioni agrarie finalizzate alla messa in livello delle camere di risaia. L'uso del suolo è per la quasi totalità dedicato alla risicoltura in sommersione.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli SANGUINOLENTO sono debolmente evoluti e naturalmente idromorfi a partire da 60-70 cm di profondità, mentre i suoli SAN PIETRO MOSEZZO, anch'essi parzialmente idromorfi, sono evoluti e hanno al di sotto dei 40 cm di profondità un orizzonte argillico. I suoli TRECATE sono ricchi di ghiaie oltre il mezzo metro di profondità.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di abbondante scheletro entro i primi 50-60 cm di profondità: TRECATE tipica. 1. Assenza di abbondante scheletro entro i primi 50-60 cm di profondità: vai a 2. 2. Assenza di un orizzonte di accumulo di argilla: SANGUINOLENTO tipica 2. Presenza di un orizzonte di accumulo di argilla: SAN PIETRO MOSEZZO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Da approfondire. Ad oggi non è stato individuato un modello ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026