

Unità operativa U1314

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	SNG1	SANGUINOLENTO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	SRP1	STROPPIANA franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	SLS1	SALASCO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

L'Unità in oggetto è costituita da due delimitazioni di forma allungata situate nella pianura vercellese. La più settentrionale è posta a sud della città di Vercelli, la più meridionale a sud di Pertendo e Stroppiana.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Pianura principale caratterizzata da un profilo uniforme. I depositi di partenza sono limosi e sabbiosi fini e sono di pertinenza di antichi passaggi fluviali della Dora Baltea successivamente ricoperti da materiali derivanti da alluvioni di corsi d'acqua minori. L'uso delle terre è per la quasi totalità dedicato alla risicoltura intensiva in sommersione.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli sono ascrivibili all'ordine degli Inceptisuoli e si differenziano per i seguenti caratteri: SANGUINOLENTO è un suolo relativamente giovane e caratterizzato da idromorfia naturale visibile entro i 60-70 cm di profondità. STROPPIANA, pur frequentemente segnato da idromorfia, si differenzia dal precedente per un maggiore grado evolutivo ma soprattutto per colori che tendono più al giallastro o al bruno giallastro rispetto alla dominanza dei colori bruni del suolo SANGUINOLENTO. SALASCO è un suolo classificato tra gli Inceptisuoli ma evidentemente di transizione agli Alfisuoli, come evidenziato dalla presenza di qualche pellicola d'argilla e dallo sviluppo di ossidi di ferro.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Assenza di condizioni di idromorfia naturale entro 60-70 cm: SALASCO tipica 1. Presenza di condizioni di idromorfia naturale entro 60-70 cm: vai a 2 2. colori dominanti bruni: SANGUINOLENTO tipica 2. Colori dominanti sul giallastro o bruno giallastro: STROPPIANA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Non è evidente un modello ricorrente di distribuzione dei suoli.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026