

Unità operativa U1315

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	SNG1	SANGUINOLENTO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
35.00	MTR1	MONTARUCCO limoso-fine, fase tipica	Aeric Endoaqualf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
15.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da una sola delineazione che si pone nella pianura vercellese ad ovest di Rive.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Superficie pianeggiante ma ondulata situata all'interno di due vecchi terrazzi più elevati in quota, a nord e a sud. I depositi sono in parte derivanti dall'erosione e dalla deposizione dei materiali relativamente fini derivanti dai suddetti terrazzi ad Alfisuoli, in parte dai depositi alluvionali dei piccoli rii che la solcano e che nel passato possono avere avuto una dinamica di maggior trasporto idrico rispetto alla situazione attuale.

Caratteri differenziali dei suoli

Suoli caratterizzati dalla presenza di idromorfia naturale (a parte l'influenza evidente in superficie della sommersione attuata per la coltivazione del riso). SANGUINOLENTO tipica ha evidenze di riduzione per la presenza di una falda (o di risalita capillare) oltre i 50-60 cm di profondità e tessiture prevalentemente franco-sabbiose o franche, MONTARUCCO tipica ha segni di idromorfia su tutto il profilo e una tessitura relativamente più fine.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. idromorfia naturale evidente oltre i 60 cm di profondità: SANGUINOLENTO tipica
1. idromorfia naturale evidente entro i 60 cm di profondità: MONTARUCCO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

La distribuzione relativa dei suoli è da approfondire.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Basso

Data di aggiornamento

04.03.2026