

Unità operativa U1316

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Complesso

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	RNS1	RONSECCO limoso-fine, fase tipica	Anthraquic Hapludalf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
30.00	MTR1	MONTARUCCO limoso-fine, fase tipica	Aeric Endoaqualf, fine-silty, mixed, nonacid, mesic	ALFISUOLI
20.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità cartografica costituita da 6 delinearazioni di varia estensione che si pongono nella pianura vercellese meridionale, nei pressi di Tricerro e a nord-est di Trino.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di vecchie superfici, evidentemente sopraelevate rispetto al livello della pianura principale, che infatti hanno suoli ad elevato grado di pedogenesi. I depositi sono fini, ricchi di limi in particolare. Sono superfici che hanno subito importanti processi erosivi di smantellamento da parte del Po a sud e da parte di antichi passaggi della Dora Baltea a nord. L'uso delle terre è per la totalità dedicato alla risicoltura intensiva.

Caratteri differenziali dei suoli

Suoli evoluti (Alfisuoli) che mostrano evidente traslocazione d'argilla e anche caratteri fragici. I suoli RONSECCO sono privi di importanti segni di idromorfia naturale nel subsoil mentre i suoli MONTARUCCO sono nettamente più idromorfi.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. idromorfia naturale evidente nel subsoil: MONTARUCCO tipica
1. idromorfia naturale assente nel subsoil: RONSECCO tipica

Modello di distribuzione dei suoli

Distribuzione da approfondire anche se pare evidente nelle piccole depressioni che sono ancora visibili una maggiore presenza dei suoli MONTARUCCO.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026