

Unità operativa U1321

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
60.00	CMP1	CAMPOMAGNO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
30.00	BLR1	BORGOLAVEZZARO sabbiosa, fase tipica	Lamellic Udipsamment, sandy, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Questa unità si trova nella pianura novarese orientale che si estende da Tornaco (NO) a sud oltre Borgolavezzaro (NO), fino al confine regionale.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di una pianura uniforme che presenta alcune leggere ondulazioni riconducibili alle deposizioni sabbiose operate da un corso d'acqua che ha nel passato deviato temporaneamente il suo corso percorrendo queste superfici. L'uso del suolo è rappresentato esclusivamente dalla coltivazione del riso.

Caratteri differenziali dei suoli

I caratteri differenziali di questi suoli sono riconducibili al maggior grado di evoluzione pedogenetica della fase CAMPOMAGNO tipica e alla classe tessiturale più grossolana (sabbiosa) della fase BORGOLAVEZZARO tipica.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Tessitura del tosoil caratterizzata da abbondanza di sabbie grossolane e scarso grado di evoluzione della pedogenesi: BORGOLAVEZZARO tipica 1. Tessitura del tposoil con ridotta percentuale di sabbie grossolane e da debole a moderato grado di evoluzione della pedogenesi: CAMPOMAGNO tipica.

Modello di distribuzione dei suoli

La fase BORGOLAVEZZARO si trova in corrispondenza delle deboli ondulazioni, in parte non più distinguibili per i livellamenti operati nella sistemazione delle camere di risaia, ove si localizzano le deposizioni sabbiose.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026