

Unità operativa U1325

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	CMP1	CAMPOMAGNO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
40.00	BAC1	BARCIOCCHINA franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		

Localizzazione geografica dell'Unità

Questa unità si trova nella pianura novarese orientale che si estende a sud-est di Sozzago (NO) verso sud, fino al confine regionale.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Porzione di pianura uniforme che mostra un orientamento diseguale degli appezzamenti che può essere ricondotto all'influenza operata da un corso d'acqua che in un recente passato ha deviato temporaneamente il suo corso. Il substrato è caratterizzato da sabbie. L'uso del suolo è caratterizzato esclusivamente dalla coltivazione del riso.

Caratteri differenziali dei suoli

I caratteri differenziali di questi suoli sono limitati alla presenza di caratteri fluventici (decrecita irregolare del contenuto di carbonio organico tra i 25 ed i 125 cm di profondità) e ad una leggera maggior evoluzione pedogenetica della fase CAMPOMAGNO tipica che non risulta però dalla classificazione tassonomica.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di caratteri fluventici: BARCIOCCHINA tipica 1. assenza di caratteri fluventici e grado di evoluzione pedogenetica leggermente superiore: CAMPOMAGNO tipica.

Modello di distribuzione dei suoli

Non è stato rilevato alcun modello di distribuzione ricorrente.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026