

Unità operativa U1326

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
40.00	FIS1	FISNENGO franco-grossolana, fase tipica	Typic Endoaquept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
25.00	MDC1	MOTTA DEI CONTI franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy over loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
10.00	XXX0	Altri suoli		
25.00	CMP1	CAMPOMAGNO franco-grossolana, fase tipica	Anthraquic Eutrudept, coarse-loamy, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Questa unità si trova nella pianura novarese orientale che si estende a est di Sozzago (NO) verso sud, fino al confine regionale.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Si tratta di paleoalvei che solcano la pianura uniforme. Queste forme hanno un tipico aspetto curvilineo e identificano i meandri di un corso d'acqua che un tempo solcava queste superfici. I sedimenti sono costituiti prevalentemente da sabbie e ghiaie. L'uso del suolo è caratterizzato in modo pressoché esclusivo dalla coltivazione del riso.

Caratteri differenziali dei suoli

I caratteri differenziali dei suoli presenti su queste superfici sono costituiti dalla presenza di caratteri di idromorfia e dalla classe di reazione del topsoil.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di caratteri di idromorfia nel subsoil: vai a 2
1. assenza di caratteri di idromorfia nel subsoil: CAMPOMAGNO tipica
2. assenza di ghiaie nei primi 60-70cm: FISNENGO tipica
2. presenza di ghiaie nei primi 60-70 cm: MOTTA DEI CONTI tipica.

Modello di distribuzione dei suoli

I suoli CAMPOMAGNO si trovano frequentemente al limite delle incisioni ove spesso sono stati fatti imponenti movimenti terra per livellare la superficie della camere di risaia adiacenti.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Iniziale

Data di aggiornamento

04.03.2026