

Unità operativa U1464

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione
Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
25.00	BTO1	BASINATTO franco-scheletrica, fase tipica	Typic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, acid, mesic	INCEPTISUOLI
50.00	LSR3	LUSERNA franco-grossolana, fase pendente	Typic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, acid, mesic	INCEPTISUOLI
25.00	LSR1	LUSERNA franco-grossolana, fase tipica	Typic Dystrudept, coarse-loamy, mixed, acid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Versanti esposti prevalentemente a nord, compresi tra le valli del Rio del Palco e del Rio Taonere e la valle del Rio Blandaero, tutti affluenti del torrente Sangone all'altezza di Giaveno (TO). Sono delineazioni strette ed allungate.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti uniformi a pendenza media, esposti a nord, che sono per la totalità coperti da boschi di latifoglie con dominanza del faggio sui castagneti e i querceti. Sono superfici relativamente stabili malgrado la pendenza come dimostra l'assenza di profonde incisioni.

Caratteri differenziali dei suoli

Sono tutti Inceptisuoli acidi. I suoli BASINATTO tipica sono scheletrico-franchi in quanto hanno notevoli percentuali di scheletro dal subsoil a differenza sei suoli LUSERNA. Questi ultimi si differenziano in funzione della maggiore (fase pendente) o minore (fase tipica) pendenza.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. presenza di scheletro nella sezione di controllo mediamente superiore al 35%: BASINATTO tipica 1. assenza di scheletro nella sezione di controllo mediamente superiore al 35%: vai a 2 2. pendenza media inferiore a 20°: LUSERNA tipica 2- pendenza media superiore a 20°: LUSERNA pendente

Modello di distribuzione dei suoli

Sulle minori pendenze domina LUSERNA tipica.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026