

Unità operativa U1502

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Associazione
Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
50.00	PLC1	PELLICE CHISONE scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Typic Udifluent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI
30.00	PLC2	PELLICE CHISONE scheletrico-sabbiosa, fase profonda	Typic Udifluent, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI
20.00	BMB1	BOMBONINA scheletrico-sabbiosa, fase tipica	Dystric Fluventic Eutrudept, sandy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Unità formata da numerose delineazioni poste nella pianura cuneese occidentale, in sinistra e destra idrografica del Po, nella zona endovaliva da Paesana a Rifreddo, e lungo tutta la valle dello Stura di Viù dal comune di Germagnano (TO), fino a Lemie (TO).

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Serie di terrazzi molto recenti debolmente sospesi sull'alveo ordinario lungo il fiume Po che sullo Stura di Viù ricomprendono al loro interno anche l'alveo alluvionale: possono essere soggetti ancora ad inondazioni e sono caratterizzati da vegetazione riparia e prati stabili poco produttivi. Sulle superfici più alte domina la praticoltura e più saltuariamente l'arboricoltura.

Caratteri differenziali dei suoli

I suoli delle fasi PELLICE CHISONE scheletrico-sabbiosa, fase tipica e PELLICE CHISONE scheletrico-sabbiosa, fase profonda sono caratterizzati dalla presenza di elevate quantità di sabbia e ghiaie con qualche differenza riguardante la profondità a cui può essere rinvenuto il livello impenetrabile di scheletro più grossolano. Nella fase BOMBONINA scheletrico-sabbiosa fase tipica vi sono altrettanto elevate quantità di ghiaie e sabbia, ma è possibile riconoscere qualche debole cenno di pedogenesi per la formazione di aggregati di suolo più stabile.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di orizzonte B cambico: BOMBONINA tipica 1. assenza di orizzonte B cambico: vai a 2 2. limite delle ghiaie entro 40 cm: PELLICE-CHISONE tipica 2. limite delle ghiaie oltre 60 cm: PELLICE CHISONE profonda.

Modello di distribuzione dei suoli

Gli entisuoli prevalgono nelle parti basse della forma, mentre gli inceptisuoli sono posizionati esclusivamente nelle parti alte.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

23.03.2026