

Unità operativa U5090

Tipo e scala dell'Unità cartografica

Gruppo indifferenziato

Scala 1:50000

Percentuale	Fase	Nome	Classificazione	Ordine
35.00	BGA2	BONAGLIA, scheletrico-franca, fase poco profonda	Typic Udorthent, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI
20.00	BGA1	BONAGLIA, scheletrico-franca, fase tipica	Typic Udorthent, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	ENTISUOLI
20.00	PRB1	PRABIANCO, scheletrico-franca, fase tipica	Typic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI
25.00	PRB2	PRABIANCO, scheletrico-franca, fase poco profonda	Typic Dystrudept, loamy-skeletal, mixed, nonacid, mesic	INCEPTISUOLI

Localizzazione geografica dell'Unità

Questa unità si localizza in media Valle Grana, in destra idrografica del torrente Grana, in prossimità delle borgate Frise, Barmà Grande, Marchion.

Descrizione del paesaggio e della genesi dei suoli

Versanti montani impostati su giacitura a reggipoggio che mostrano un profilo uniforme e un grado di pendenza da acclive a fortemente acclive. La litologia è costituita da calcescisti, calcemicascisti o calcescisti filladici, con presenza di alcuni affioramenti rocciosi. Sono le forme di costa dei versanti descritti nell'unità U5088, da cui si distinguono per le più elevate pendenze e per una copertura uniforme a bosco misto con dominanza di acero e frassino. L'esposizione dei versanti è prevalentemente orientata ad est e a ovest.

Caratteri differenziali dei suoli

La presenza del substrato entro i primi 50 cm e il grado di sviluppo pedogenetico costituiscono i caratteri distintivi dei suoli. I suoli PRABIANCO hanno evidenza di un'evoluzione dei processi pedogenetici che si manifesta nella formazione di un orizzonte sotto superficiale con sviluppo di colore e struttura, mentre i suoli BONAGLIA non mostrano una differenziazione di colore scendendo lungo il profilo. La presenza di substrato affiorante entro i primi 50 cm di profondità identifica le fasi poco profonde di entrambi questi suoli.

Chiave di riconoscimento dei suoli

1. Presenza di un orizzonte con formazione di colore e struttura (Bw): vai a 2
1. assenza di un orizzonte con formazione di colore e struttura (Bw): vai a 3
2. presenza di substrato affiorante entro i primi 50 cm: PRABIANCO poco profonda
2. assenza di substrato affiorante entro i primi 50 cm: PRABIANCO tipica
3. presenza di substrato affiorante entro i primi 50 cm: BONAGLIA poco profonda
3. assenza di substrato affiorante entro i primi 50 cm: BONAGLIA tipica

Modello di distribuzione dei suoli

La fase PRABIANCO poco profonda si trova ove il substrato è affiorante, mentre la fase BONAGLIA poco profonda è localizzata dove i fenomeni erosivi sono più marcati. Entrambe queste fasi sono più diffuse sulle porzioni di versante a pendenza più elevata.

Unità cartografiche concorrenti

Non esistono unità concorrenti.

Grado di fiducia dell'Unità Cartografica

Buono

Data di aggiornamento

04.03.2026